

Tabela 3

Dodatki do żywności niewskazane w diecie dzieci

Spis treści

1. SUBSTANCJA DODATKOWA.....	1
1. 1. ACESULFAM K - E 950.....	1
1.2. AMARANT - E 123.....	2
1.3. ASPARTAM - E 951.....	2
1.4. AZORUBINA - E 122.....	2
1.5. AZOTANY SODU - E 251, AZOTANY POTASU - E 252.....	3
1.6. AZOTYNY POTASU - E 249, AZOTYNY SODU - E 250.....	3
1.7. BRĄZ HT - E 155.....	3
1.8. CZERWIŃ KOSZENILOWA - E 124.....	3
1.9. CZERWIŃ ALLURA AC - E 129.....	4
1.10. GLUKURONOLAKTON.....	4
1.11. GLUTAMINIAN SODU - E 621.....	4
1.12. KARMEŁ SIARCZYNOWY - E 150b, KARMEŁ AMONIAKALNY - E 150c, KARMEŁ AMONIAKALNO-SIARCZYNOWY - E 150d.....	5
1.13. KOFEINA.....	5
1.14. KWAS CYKLAMINOWY I JEGO SOLE: SODOWA, POTASOWA, CYKLAMINIANY - E 952.....	6
1.15. KWAS FOSFOROWY - E 338.....	6
1.16. KWAS KARMINOWY, KARMINA – KOSZENILA - E 120.....	6
1.17. KWAS BENZOESOWY - E 210, BENZOESAN: POTASU - E 212, SODU - E 211, WAPNIA - E 213.....	7
1.18. SYROP GLUKOZOWY, SYROP GLUKOZOWO-FRUKTOZOWY.....	7
1.19. TAURYNA.....	8
1.22. ŻÓŁCIEŃ CHINOLINOWA - E 104.....	9
1.23. ŻÓŁCIEŃ POMARAŃCZOWA FCF - E 110.....	9
SUBSTANCJE DODATKOWE, W ŚWIEŁLE DOSTĘPNYCH WYNIKÓW BADAŃ. Wpływ barwników na zachowanie dzieci.....	9

1. SUBSTANCJA DODATKOWA.

1.1. ACESULFAM K - E 950.

Funkcja: substancja słodząca; substancja wzmacniająca smak i zapach

Źródło w pożywieniu: napoje, napoje bezalkoholowe, napoje o zawartości alkoholu poniżej 15% obj., słodziki stołowe, wyroby cukiernicze, przetwory zbożowe, syropy, napoje mleczne, desery, lody, ciasta, słodycze, koncentraty zup i sosów, gumy do żucia, preparaty do higieny jamy ustnej
Acesulfam K jest odporny na temperaturę do 200°C, zatem może być stosowany do pieczenia i gotowania.

Wpływ na zdrowie: ból głowy, nadpobudliwość, problemy z wątrobą, kłopoty ze wzrokiem, problemy z oddychaniem, choroby nerek, u zwierząt doświadczalnych odnotowano nowotwory

1.2. AMARANT - E 123.

Funkcja: barwnik

Źródło w pożywieniu: kolorowe napoje alkoholowe, płatki zbożowe, kawior, ciasta w proszku, galaretki, kasze, napoje bezalkoholowe, przetwory z czarnej porzeczki

Wpływ na zdrowie: -odpowiedzialny za odkładanie się wapnia w nerkach, niebezpieczny dla astmatyków, ma działanie mutogenne (udowodnione u szczurów), podejrzewany o działanie rakotwórcze

1.3. ASPARTAM - E 951.

Funkcja: substancja słodząca, substancja wzmacniająca smak

Źródło w pożywieniu: napoje, napoje bezalkoholowe, napoje o zawartości alkoholu poniżej 15% obj., dżemy i przetwory owocowe, desery, koncentraty zup i sosów, słodziki stołowe, wyroby cukiernicze, ciastka, słodycze, gumy do żucia, w lekach (najczęściej tych przeznaczonych dla dzieci)

Wpływ na zdrowie: Aspartam i produkty jego rozpadu zostały uznane za bezpieczne i nie stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia konsumentów (na poziomie dopuszczalnego spożycia).

Niektóre badania pokazują, że po spożyciu występowały: zawroty i bóle głowy, napady padaczkowe, migrena, upośledzenie percepcji, pobudzenie, agresja, frustracja, depresja, zaburzenia ustroju.

Aspartam jest źródłem fenyloalaniny. Osoby chore na fenyloketonurię powinny wykluczyć go z diety. Wysokie stężenia fenyloalaniny oraz jej metabolitów we krwi u osób dotkniętych tą chorobą może mieć działanie toksyczne oraz prowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia mózgu.

1.4. AZORUBINA - E 122.

Funkcja: barwnik

Źródło w pożywieniu: aromatyzowane napoje bezalkoholowe, lody, budynie w proszku, wyroby piekarnicze i cukiernicze

Wpływ na zdrowie: niebezpieczna dla astmatyków, może powodować nadpobudliwość u dzieci, powinny jej unikać osoby uczulone na aspirynę, kancerogeny (rakotwórczy) u zwierząt

1.5. AZOTANY SODU - E 251, AZOTANY POTASU - E 252.

Funkcja: substancja konserwująca

Źródło w pożywieniu: mięso, przetwory mięsne, warzywa (nieprawidłowe nawożenie), woda pitna (zanieczyszczona nawozami)

Wpływ na zdrowie: Choć związki te nie są uznawane za toksyczne dla ludzi, to jednak pod wpływem działania mikroflory organizmu ludzkiego mogą ulegać przemianom do groźnych azotynów w sposób niekontrolowany.

Spożycie warzyw i wody zanieczyszczonej azotanami powoduje ich magazynowanie w organizmie, gdzie przekształcane są w azotyny, wywierając szkodliwe działanie na zdrowie.

Redukcja azotanów do azotynów może doprowadzić do methemoglobinemii objawiającej się: sinicą, dusznością, sennością, bólem brzucha. W ciężkiej postaci może dojść do zgonu pacjenta.

1.6. AZOTYNY POTASU - E 249, AZOTYNY SODU - E 250.

Funkcja: substancja konserwująca, pozwala uzyskać pożądaną barwę produktu

Źródło w pożywieniu: przetwory mięsne, wyroby garmażeryjne

Wpływ na zdrowie: Nadmierne pobranie azotynów może prowadzić do methemoglobinemii (objawy jw.). Ryzyko związane z peklowaniem wiąże się z tworzeniem z azotynów biogenych amin – nitrozamin – związków o działaniu rakotwórczym.

Z tego względu nie należy ogrzewać peklowanych przetworów mięsnych, konserwowanych wędlin, a przetwory mięsne używane np. do grillowania nie powinny być peklowane, ponieważ w temperaturze powyżej 150°C powstają właśnie szkodliwe nitrozoaminy.

Nitrozoaminy powstają również, gdy podgrzewa się razem produkty bogate w aminy – np. żółty ser, z przetworami mięsnymi zawierającymi azotyny – np. zapiekanka z szynką i serem czy pizza z szynką lub salami i serem.

1.7. BRĄZ HT - E 155.

Funkcja: barwnik

Źródło w pożywieniu: odporny na działanie wysokiej temperatury, stąd powszechnie stosowany przy produkcji: ciasta w proszku, czekoladowych ciastek i herbatników.

Ponadto może być również stosowany do: napojów bezalkoholowych, lodów

Wpływ na zdrowie: biegunki, pokrzywka, reakcje alergiczne, może nasilać objawy astmy, niezalecany dla dzieci i osób z nietolerancją aspiryny, może odkładać się w nerkach i naczyniach limfatycznych

1.8. CZERWIEN KOSZENILOWA - E 124.

Funkcja: barwnik

Źródło w pożywieniu: kolorowe napoje alkoholowe, lody, desery, wyroby piekarnicze i cukiernicze, galaretki w proszku, dżemy, polewy deserowe, wata cukrowa, budynie w proszku, napoje mleczne, oranżady, herbaty w proszku, tabletki na ból gardła

Wpływ na zdrowie: objawy alergii – katar sienny, niebezpieczna dla astmatyków, może powodować nadpobudliwość u dzieci

1.9. CZERWIEN ALLURA AC - E 129.

Funkcja: barwnik

Źródło w pożywieniu: żelki, ciastka, galaretki, słodkie napoje, płatki zbożowe

Wpływ na zdrowie: nasila zaburzenia koncentracji, po spożyciu daje objawy ADHD, podejrzewana o działanie kancerogenne (rakotwórcze).

Udowodniono, że jego spożycie w większych ilościach powoduje raka pęcherza u zwierząt, w wyniku działania produktów jego degradacji.

1.10. GLUKURONOLAKTON.

Funkcja: antyoksydant, substancja wspomagająca odtruwanie

Źródło w pożywieniu: wymieniany jest w składzie: suplementów diety, odchudzających, napojów energetycznych, preparatów treningowych, dla sportowców, które zawierają również kofeinę i inne substancje

Wpływ na zdrowie: ma działanie detoksykujące (składnik leków wspomagających odtruwanie wątroby), może mieć wpływ na przemianę glukozy w organizmie, przypisuje mu się właściwości regeneracyjne, zapobiega nadmiernemu odkładaniu tłuszczu na skutek nadmiernej stymulacji insuliny, zmniejsza uczucie senności, pozytywnie wpływa na refleks i koncentrację, ma działanie regenerujące.

Brakuje badań na temat wpływu dużych dawek glukuronolaktonu na organizm.

Stosowanie go w napojach energetyzujących wywołuje wiele kontrowersji, ponieważ zdania nt. bezpieczeństwa jego stosowania są podzielone.

ukuronolakton to produkt chemiczny, stworzony przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych w latach sześćdziesiątych, by stymulować morale wojska w Wietnamie – działał jak narkotyk halucynogeny, miał łagodzić syndrom stresu wojennego.

1.11. GLUTAMINIAN SODU - E 621.

Funkcja: substancja bez smaku, wzmacnia smak i zapach innych potraw

Źródło w pożywieniu: koncentraty spożywcze, zupy, sosy i dania w proszku, przyprawy, sos sojowy, wędliny, konserwy.

Glutaminian sodu i inne wzmacniacze smaku są chętnie stosowane do produktów, które w trakcie obróbki lub na skutek procesu technologicznego straciły częściowo swój naturalny smak.

Stąd obecne są w niemal wszystkich produktach wysoko przetworzonych, takich jak np. sproszkowane zupy czy konserwy.

Jest na tyle atrakcyjny, że w Japonii określa się go mianem *umami* – wyśmienity, smakowity.

Wpływ na zdrowie: glutaminian sodu obwinia się o wywoływanie reakcji alergicznej po zjedzeniu potraw kuchni azjatyckiej, w której jest używany (tzw. syndrom chińskiej restauracji).

Niektóre osoby uskarżają się na pieczenie warg, podrażnienie spojówek, nudności, a nawet wymioty, bóle i sztywność karku. Nadwrażliwość na ten składnik jest kwestią indywidualną. Drażniąco mogą działać inne ostre przyprawy (między innymi chili), sosy ze skorupiaków lub fermentowana soja – wszystkie te składniki są używane w kuchni azjatyckiej¹.

Może nasilać problemy astmatyczne, powodować bóle głowy, przyspieszone bicie serca, pogorszenie wzroku, nudności, bezsenność, osłabienie, otyłość.

1.12. KARMEL SIARCZYNOWY - E 150b, KARMEL AMONIAKALNY - E 150c,

KARMEL AMONIAKALNO-SIARCZYNOWY - E 150d.

Funkcja: barwnik

Źródło w pożywieniu: słodycze, alkohole, herbaty rozpuszczalne, napoje typu cola, gotowe desery, sosy, lody, dżemy, pieczywo i przetwory zbożowe (zafałszowanie), kiełbasy, pasztety, burgery

Wpływ na zdrowie: problemy żołądkowo-jelitowe, zwiększa ruch robaczkowy jelit, może prowadzić do nadpobudliwości, wywiera negatywny wpływ na płodność, może zawierać toksyczne

związki, które w dużych dawkach powodują u zwierząt doświadczalnych zmiany w obrazie krwi, skurcze mięśni, zaburzenia w metabolizmie witaminy B6

1.13. KOFEINA.

Funkcja: pobudza/ usuwa zmęczenie, usprawnia procesy myślowe

Źródło w pożywieniu: naturalny alkaloid (zasadowy związek chemiczny, głównie pochodzenia roślinnego, zawierający azot) występujący między innymi w liściach, nasionach i owocach wielu roślin. Powszechnie znanym źródłem kofeiny są: kawa, herbata, ziarno kakaowe, orzeszki cola, guarana, dzięki swoim właściwościom pobudzającym, coraz częściej jest stosowana w produkcji napojów energetyzujących, słodczy, w tym cukierki z kofeiną

Wpływ na zdrowie: Kofeina jest związkiem, który powoduje zmiany w wydzielaniu neuroprzekazników w mózgu, przez co może działać: mobilizująco, zmniejszać uczucie zmęczenia, zwiększać koncentrację, skracać czas reakcji, wpływać na poprawę nastroju, pobudzać procesy myślowe, rozszerzając naczynia krwionośne zwiększa adaptację mięśni do wysiłku fizycznego, poprawia ukrwienie serca, ale również może mieć działanie negatywne: obciążać wątrobę i żołądek, negatywnie wpływać na samopoczucie, pamięć długotrwałą i koncentrację, usuwa wapń i magnez z organizmu, przez co może negatywnie wpływać na stan kośćca. Spożywania kofeiny powinni unikać: diabetycy, kobiety w ciąży, osoby nadwrażliwe.

Dobowa dawka kofeiny dla zdrowej dorosłej osoby nie powinna przekroczyć 600 mg, spożycie powyżej 0,5 g może dawać objawy przedawkowania: silne pobudzenie psychoruchowe, bezsenność, migotanie komór serca, osłabienie, nudności i wymioty.

U dzieci przy dawce 3 mg kofeiny na 1 kg masy ciała obserwowano: nerwowość, bóle brzucha, nudności.

W skrajnych przypadkach nadmierne spożycie skutkować może: porażeniem układu nerwowego drgawkami, a nawet śmiercią. Dawka śmiertelna ustalana jest według przelicznika 150 mg kofeiny na 1 kg masy ciała (co dla dorosłego zdrowego człowieka oznacza średnio 80 filiżanek kawy).

1.14. KWAS CYKLAMINOWY I JEGO SOLE: SODOWA, POTASOWA, CYKLAMINIANY - E 952.

Funkcja: substancja słodząca

Źródło w pożywieniu: produkty typu light, napoje gazowane, gumy do żucia, wypieki ciastkarskie i cukiernicze ze względu na ich właściwości fizyczne (odporność na wysokie temperatury)

Wpływ na zdrowie: powodują zaburzenia metabolizmu i aktywności wielu leków, w szczególności doustnych preparatów stosowanych w leczeniu cukrzycy, powodują zwiększone wydalanie potasu

w testach na zwierzętach podawanie dużych dawek prowadziło do nowotworu pęcherza, zmniejszonej płodności i zmian w komórkach. W nowszych badaniach obserwacje te nie potwierdziły się.

Dziecko o masie ciała 25 kg przekroczy wartość dopuszczalnego dziennego pobrania (ADI) po spożyciu 200 g jogurtu light.

W przypadku osoby dorosłej o masie ciała 60 kg, wartość ADI zostanie osiągnięta po wypiciu jednej szklanki napoju Light.

1.15. KWAS FOSFOROWY - E 338.

Funkcja: regulator kwasowości

Źródło w pożywieniu: słodczyce, bezalkoholowe napoje gazowane (głównie typu cola), galaretki, sery, produkty mięsne, wino owocowe, miód pitny, napoje dla sportowców, napoje spirytusowe z wyjątkiem whisky, przekąski na bazie ziemniaków, zbóż, mąki, przetworzone orzechy, mieszanki deserowe w proszku

Wpływ na zdrowie: powoduje demineralizację kości (pozbawia ich wapnia), osłabia zęby i ich szkliwo.

Powinny się go wystrzegać osoby cierpiące na osteoporozę oraz kobiety w wieku menopauzalnym. Może wywierać również niekorzystny wpływ na rozwój kośćca i jego stan u dzieci i młodzieży.

1.16. KWAS KARMINOWY, KARMINA – KOSZENILA - E 120.

Funkcja: barwnik

Źródło w pożywieniu: napoje alkoholowe, sosy, nadzienia owocowe, mięsa, wypieki, jogurty, polewy

Wpływ na zdrowie: Jest naturalnym barwnikiem pochodzenia zwierzęcego. Koszenila produkowana jest z odpowiednio przygotowanych owadów zwanych czerwcami.

Ze względu na zanieczyszczenia, które mogą się znaleźć w gotowym preparacie, może wywołać u nielicznej grupy osób: wstrząs anafilaktyczny, katar sienny, pokrzywkę. Sam kwas karminowy nie jest niebezpieczny dla zdrowia.

1.17. KWAS BENZOESOWY - E 210, BENZOESAN: POTASU - E 212, SODU - E 211, WAPNIA - E 213.

Funkcja: substancja konserwująca

Źródło w pożywieniu: Ma powszechne zastosowanie!

soki owocowe, galaretki, napoje, margaryny, sosy owocowe i warzywne, konserwy rybne, koncentraty pomidorowe

Wpływ na zdrowie: Na substancje z tej grupy powinni uważać szczególnie alergicy, a zwłaszcza osoby uczulone na aspirynę. Mieszanina sztucznych barwników i benzoesanu sodu wpływa na wystąpienie nadpobudliwości u dzieci (objawy ADHD).

Astma, pokrzywka, nadpobudliwość, wymioty, podrażnia śluzówkę żołądka i jelit, w połączeniu z witaminą C może reagować tworząc benzen (C_6H_6) – związek rakotwórczy, podejrzewany o niszczenie mitochondriów komórek, co może powodować ich degenerację i być przyczyną choroby Parkinsona.

1.18. SYROP GLUKOZOWY, SYROP GLUKOZOWO-FRUKTOZOWY.

Funkcja: substancja słodząca

Źródło w pożywieniu: powszechny, występuje w wielu grupach produktów spożywczych: żywność typu light, mleko zagęszczone, napoje mleczne jogurty, serki i deserki mleczne lody, napoje owocowe i nektary, napoje energetyzujące i izotoniczne, konserwy rybne, wyroby garmazeryjne, sałatki, dżemy, wędliny, keczup, musztarda, płatki śniadaniowe, słodycze!, napoje gazowane, mrożona herbata, likiery, toniki, wyroby piekarskie i cukiernicze (tani zamiennik cukru, nie krystalizuje)

Wpływ na zdrowie: Fruktaza, stanowiąca jego główny składnik (55% fruktozy, 42% glukozy i 3% wyższych sacharydów), nie budziła zastrzeżeń żywieniowych i była wykorzystywana w żywności dla cukrzyków. Z powodu powszechnego zastosowania doszło do paradoksu – obecnie nadmierne spożycie fruktozy prowadzi do: nadciśnienia tętniczego, zaburzenia gospodarki lipidowej, rozwoju insulinooporności, czyli zmniejszenia się wrażliwości mięśni, tkanki tłuszczowej, wątroby oraz innych tkanek organizmu na insulinę.

Nadmierne spożycie fruktozy przekłada się również na znaczny wzrost otyłości, ponieważ hamuje ona proces towarzyszący wydzielaniu leptyny – hormonu odpowiedzialnego za uczucie sytości.

Nie jest zatem przypadkiem, że pijąc popularne napoje gazowane, trudno ugasić pragnienie.

Konsekwencją powszechnego zastosowania syropu w produkcji żywności jest wzrost cukrzycy i otyłości: podwyższa poziom „złego” cholesterolu, może doprowadzić do cukrzycy i rozwoju otyłości, podwyższa ciśnienie krwi, wywołuje stany zapalne organizmu, prowadzi do bezalkoholowego stłuszczenia wątroby, zwiększa ryzyko nowotworów, powoduje problemy z sercem.

1.19. TAURYNA.

Funkcja: biostymulator - wpływa na metabolizm oraz przyspiesza regenerację mięśni

Źródło w pożywieniu: napoje energetyzujące, mleka modyfikowane dla dzieci, odżywki dla sportowców zawierające również kofeinę, glukuronolakton i inne substancje, suplementy diety, karmy dla zwierząt

Wpływ na zdrowie: wpływa negatywnie na poziom wapnia w komórkach, odpowiada za osmoregulację (równowaga wodno-elektrolitowa), wpływa na produkcję hormonów odpowiedzialnych za spalanie i wydalanie tłuszczów, pełni rolę neurotransmitera (neuroprzekaznik – związek chemiczny, którego cząsteczki przenoszą sygnały pomiędzy neuronami poprzez synapsy, a także z komórek nerwowych do mięśniowych lub gruczołowych), ma działanie antyoksydacyjne, bierze także udział w syntezie kwasów żółciowych (wspomaga trawienie), przyspiesza detoksykację, zwiększa siłę skurczową mięśnia sercowego, suplementy z tauryną pomagają zwiększyć masę mięśni, utrudnia zasypianie, rozszerza naczynia krwionośne, ułatwia oddychanie poprzez rozkurcz mięśni w oskrzelach, może wchodzić w interakcje z niektórymi lekami.

Niektóre badania przypisują taurynie udział w procesach poznawczych oraz uczenia się. Powinna być ograniczona w diecie dzieci ze względu na nadmierne działanie pobudzające. Szczególnie że w żywności towarzyszą jej inne substancje pełniące podobną rolę, łatwo więc może dojść do nadmiernej suplementacji.

1.20. TARTRAZYNA - E 102.

Funkcja: barwnik

Źródło w pożywieniu: napoje w proszku, napoje bezalkoholowe, likiery owocowe, polewy, koncentraty zup i deserów, galaretki, dżemy, miód sztuczny, musztarda, niskiej jakości napoje gazowane, słodyczne

Wpływ na zdrowie: Jest to jeden z niebezpieczniejszych barwników stosowanych w żywności. Barwnik ten zawiera histaminę, może więc powodować wzmożenie objawów chorobowych u astmatyków, u osób z nietolerancją aspiryny może powodować nasilenie objawów; bezsenność, agresja, dezorientacja, depresja, nadpobudliwość, dekoncentracja, objawy astmy, pokrzywka, zapalenie skóry, katar sienny, może wywołać dychawicę.

W połączeniu z benzoesanami jest podejrzewany o wywoływanie ADHD u dzieci.

1.21. TŁUSZCZE TRANS.

Źródło w pożywieniu: margaryny, wyroby piekarskie i cukiernicze (słodkie i słone ciastka i ciasteczka), chrupki, prażynki, chipsy, dania typu instant, dania typu fast food, powstają „na patelni” w procesie smażenia

Wpływ na zdrowie: sprzyjają powstawaniu chorób cywilizacyjnych, mają zdolność zlepiania tętnic, prowadząc do stanów zapalnych w obrębie naczyń krwionośnych, sprzyjają miażdżycy, powodują problemy z układem krążenia – zawał serca i udar, spożywane w większych ilościach zwiększają ryzyko zachorowania na raka jelita grubego aż o 86%, tłuszcze trans sprzyjają insulinooporności, a w efekcie mogą prowadzić do otyłości.

Na tłuszcze trans powinny również zwrócić uwagę osoby mające problem z nieprawidłową wartością cholesterolu w surowicy krwi.

1.22. ŻÓŁCIEŃ CHINOLINOWA - E 104.

Funkcja: barwnik

Źródło w pożywieniu: napoje gazowane, cukierki na kaszel, lody, galaretki, słodyczne

Wpływ na zdrowie: zaczerwienienie, wysypka, anaflaksja, impulsywność, niepokój, nadpobudliwość ruchowa, problemy z koncentracją.

Osoby cierpiące na astmę i uczulone na aspirynę powinny stanowczo unikać tego barwnika.

Na podstawie przeprowadzonych badań (2007 r. w Wielkiej Brytanii w Southampton) stwierdzono, że powoduje nadpobudliwość u dzieci. Konsekwencją tych badań jest obowiązek od 20 lipca 2010 r. umieszczania informacji na etykietach środków spożywczych bezpośrednio po nazwie lub numerze E barwnika: „może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci”.

1.23. ŻÓŁCIEŃ POMARAŃCZOWA FCF - E 110.

Funkcja: barwnik

Źródło w pożywieniu: napoje bezalkoholowe, napoje w proszku, lody, desery, marmolada, wyroby piekarnicze i cukiernicze, guma do żucia, żelki, musztarda, koncentraty zup i sosów w proszku, marmolada, płatki zbożowe, konserwy rybne

Wpływ na zdrowie: pokrzywka, zapalenia błony śluzowej nosa, bóle brzucha, nudności, wymioty, niestrawność, wpływa na występowanie nadpobudliwości u dzieci, zwiększa częstość występowania nowotworów u zwierząt, powinny unikać jej osoby uczulone na aspirynę

SUBSTANCJE DODATKOWE, W ŚWIELE DOSTĘPNYCH WYNIKÓW BADAŃ¹. Wpływ barwników na zachowanie dzieci

W 2007 r. w Wielkiej Brytanii zostały wykonane badania mające na celu stwierdzenie wpływu spożycia 6 barwników na zachowanie dzieci (tzw. „badania z Southampton”). Barwniki będące przedmiotem badań to: tartrazyna (E102), żółcień chinolinowa (E104), żółcień pomarańczowa FCF (E110), azorubina (E122), czerwień koszenilowa A (E124) oraz czerwień Allura AC (E129). Badania przeprowadzono na grupie 153 dzieci 3-letnich oraz 144 dzieci 8- i 9-letnich.

Wyniki badań sugerowały, że spożycie napoju zawierającego mieszaninę barwników było związane z wystąpieniem nadaktywności w obu grupach wiekowych dzieci. Zaobserwowano następujące objawy: przerywanie lub mówienie zbyt wiele, „wiercenie się”, wzburzenie z błahej przyczyny (impulsywność), niepokój, nadpobudliwość ruchowa, problemy z koncentracją.

Wyniki badań nie były jednoznaczne, jednakże w krajach Unii Europejskiej wprowadzono obowiązek umieszczania obostrzenia na etykietach środków spożywczych zawierających którykolwiek z ww. barwników. Ostrzeżenie jest podawane bezpośrednio po nazwie lub numerze E barwnika w postaci następującego sformułowania: *„może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci”*².

W 2004 r. grupa amerykańskich naukowców opublikowała badania, w których postawili hipotezę mówiącą o tym, że syrop glukozowo-fruktozowy stanowi bezpośrednią przyczynę narastającej fali otyłości w USA. Naukowcy swoją hipotezę oparli na dwóch trudnych do podważenia argumentach. Po pierwsze, w latach 1970-2000 gwałtownie wzrósł odsetek otyłych osób w Ameryce. Po drugie, w tym samym czasie konsumpcja HFCS zwiększyła się 1000%. Powiązanie tych faktów uznano za coś więcej niż tylko przypadek³.

Jaki wpływ na nasze zdrowie ma glutaminian sodu (E621)?

Na całym świecie prowadzone są badania nad oddziaływaniem glutaminianu sodu na nasze zdrowie:

¹ Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny

² Z wykorzystaniem informacji zawartych na stronie: Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku

Pracodawców: <http://pfpz.pl/>

³ www.medonet.pl

- badacze z Uniwersytetu w Północnej Karolinie donoszą, że dieta bogata w E621 zwiększa ryzyko nadwagi i otyłości do 3 razy, nawet przy stosowaniu diety zgodnej z zaleceniami profilaktycznymi otyłości.
- w Zakładzie Fizjologii na AWF w Warszawie udowodniono, że glutaminian sodu przyjmowany nawet w małych ilościach powoduje niekorzystny wpływ na przewodnictwo nerwowo-mięśniowe, może wywołać sztywność, opuchnięcie mięśni, letarg, padaczkę, bóle stawów, bóle mięśni podobne do tych występujących przy grypie, bóle w klatce piersiowej, utracie równowagi, zaburzenia mowy.
- badania profesora Jima Stevensona wykazały, że u dzieci przyjmujących z pożywieniem mieszankę dodatków spożywczych (barwniki stosowane od lat w produktach dla dzieci, substancje konserwujące np. benzoosan sodu) zaobserwowano wyraźne zmiany w zachowaniach, w tym nadpobudliwość, napady niepokoju lub wręcz paniki, dezorientację.
- badania prowadzone w Japonii i Waszyngtonie wskazują na toksyczność glutaminianu sodu. Spożycie większej ilości E621 uszkadza siatkówkę i może doprowadzić do zaburzeń hormonalnych.